

Parte B dell'esame, Massage und physikalische Therapieformen

B.1, Manuelle Lymphdrainage

Caso esemplificativo: edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura

Candidata/candidato:

N.:

Calcolo: (punti ottenuti / punti massimi x 5) + 1 (da compilare dalla segreteria d'esame)	VOTO	
---	-------------	--

punti	punti max	punti ott.
Pagina 1	15	
Pagina 2	15	
Pagina 3	15	
Pagina 4	5	
Totale	50	

Data:				
	Nome	Firma	Visto	
Esperto/a 1			CGQ	
Esperto/a 2				

B.1, Manuelle Lymphdrainage

Caso esemplificativo: edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura

N.:

Decisione terapeutica / clinica			
punti max	Criteri di valutazione	punti ott.	Spiegazione se non è stato raggiunto il voto 6
2	Informa il paziente sulla metodica da eseguire e chiede il consenso		
2	Esegue una breve anamnesi ed esclude le controindicazioni		
1	Prepara la postazione di lavoro		
6	Effettua le misurazioni, apertura della bocca, estensione cervicale		
1	Istruisce il paziente sulle modalità della terapia		
1	Chiede al paziente come si sente durante il trattamento e adatta di conseguenza l'intervento		
2	Posiziona il paziente in base al quadro clinico e garantisce la privacy		
15	Totale pagina (riportare sulla copertina)		

B.1, Manuelle Lymphdrainage

Caso esemplificativo: edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura

N.:

Technische Fertigkeiten			
punti max	Criteri di valutazione	punti ott.	Spiegazione se non è stato raggiunto il voto 6
2	Preparazione		
2	Specificità dei parametri		
2	Luogo e impostazione del trattamento		
6	Manovre scelte ed esecuzione corretta (almeno 3 manovre diverse devono essere dimostrate)		
1	Rispetta l'ergonomia per il terapeuta		
2	Gestione del tempo del trattamento		
15	Totale pagina (riportare sulla copertina)		

B.1, Manuelle Lymphdrainage

Caso esemplificativo: edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura

N.:

Fachwissen			
punti max	Criteri di valutazione	punti ott.	Spiegazione se non è stato raggiunto il voto 6
5	Principio d'azione del linfodrenaggio manuale		
4	Informazione sulle possibili reazioni dopo il trattamento		
4	Indicazioni su cosa può fare il paziente in caso di reazioni post-trattamento		
2	Proseguo (piano terapeutico)		
15	Totale pagina (riportare sulla copertina)		

B.1, Manuelle Lymphdrainage

Caso esemplificativo: edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura

N.:

Kommunikation – und Sozialkompetenzen			
punti max	Criteri di valutazione	punti ott.	Spiegazione se non è stato raggiunto il voto 6
1	Saluto e congedo dal paziente, nome, funzione, corretta igiene delle mani (secondo EN 1500) o lavaggio		
2	Aspetto esteriore e competenza di presentazione		
2	Capacità comunicativa, uso di un linguaggio adatto al paziente		
5	Totale pagina (riportare sulla copertina)		