

Partie d'examen B, formes de massage et applications de thérapie physique

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

Candidat/Candidate

Déroulement de l'examen	Min.
1. Entrée dans la salle d'examen • Contrôle d'identité (vérification de la pièce d'identité) • Vérification et préparation du poste de travail	1
2. Consignes • Lecture de l'étude de cas • Analyse de la tâche attribuée • Planification de la démarche thérapeutique	5
3. Réalisation pratique • Application du drainage lymphatique manuel selon le cas présenté • Communication professionnelle avec la patiente / le patient • Respect des normes d'hygiène et de sécurité	30
Durée de l'examen	36
4. Valutazione • Valutazione strutturata da parte delle esperte e degli esperti secondo i criteri definiti	9
Durée totale, examen inclus	45

Partie d'examen B, formes de massage et applications de thérapie physique

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

Candidat/Candidate

Description de la situation

- Les informations sont présentes dans le texte et à votre disposition.
- Vous travaillez en pratique sur la patiente simulée / le patient simulé.

Consignes

- Lisez l'étude de cas fournie.
- Respectez les mesures d'hygiène (EN 1500 ou lavage des mains).
- Préparez votre poste de travail.
- Saluez votre patiente / patient et présentez-vous (nom, prénom et fonction).
- Expliquez votre mission (drainage lymphatique manuel) ainsi que le déroulement prévu du traitement.
- Réalisez une courte anamnèse (l'anamnèse ou le bilan complet a déjà été effectué).
- Identifiez et prenez en compte d'éventuelles contre-indications (par ex. signes d'infection, érysipèle...)
- Effectuez un test de mobilité de l'extension de la colonne cervicale.
- Testez l'ouverture buccale.
- Positionnez la patiente / le patient de manière appropriée selon le tableau clinique.
- Réalisez le drainage lymphatique manuel (les répétitions peuvent être abrégées).
- Pendant le traitement, expliquez les principes d'action des techniques employées ainsi que les zones de drainage lymphatique traitées.
- La pose de bandage ne fait pas partie de l'examen.
- Informez sur les étapes suivantes (plan thérapeutique, suivi de l'évolution).
- Expliquez les réactions possibles après le traitement, ainsi que la manière de les gérer.
- Prenez congé de la patiente / du patient.
- Désinfectez tout le matériel utilisé.
- Rangez tout le matériel utilisé et quittez la salle d'examen dans l'état où vous l'avez trouvée.

Partie d'examen B, formes de massage et applications de thérapie physique

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

Candidat/Candidate

Anamnèse et description des symptômes cliniques
Données patient
Madame/Monsieur : Strauss Âge : 24 ans Profession : Étudiante / Étudiant
Diagnostic
Edema facciale post-traumatico (periorbitale/zigomatico) con ematomi dopo contusione cranica, senza evidenza di frattura
Postopératoire
2 jours
Anamnèse de l'apparition
Chute en trottinette sur une chaussée mouillée avec impact frontal sur l'asphalte. Bilan d'urgence, y compris un scanner crânien, sans preuve de lésions osseuses ni de pathologies intracrâniennes.
Anamnèse
• Sensation intense de tension au niveau du visage, notamment péri-orbitaire et zygomatique. • Aucun signe neurologique (pas de vertiges, pas de nausées, pas de trouble de la conscience). • Pas de fièvre, pas de signes d'infection.
Médicaments / Précautions
• Pas de traitement au long cours. • Prise d'antalgiques si besoin. • Complications intracrâniennes exclue.
Bilan clinique
• Œdème mou, dépressible, au niveau péri-orbitaire et zygomatique, des deux côtés. • Importants hématomes péri-orbitaires. • Douleur à la pression localisée (NRS 3–4/10). • Pas de surchauffe ni de rougeur évocatrices d'infection. • Aucun signe neurologique remarquable. • Extension active du rachis cervical à 30°, puis sensation de tension au niveau du visage. • Ouverture buccale active limitée à 3 cm, sensation de forte tension.